



ウンカ類発生状況報告書



(トビイロウンカ発生程度別基準)

※要防除水準

程度	無	少	中	多	甚
株あたり虫数	0	1～5	6～21	21～50	51以上

(セジロウンカ発生程度別基準)

※要防除水準

程度	無	少	中	多	甚
1株あたり虫数	0	1～10	11～50	51～100	101以上

(ヒメトビウンカ発生程度別基準)

※要防除水準

程度	無	少	中	多	甚
1株あたり虫数	0	1～2	3～5	6～10	11以上

(植物防疫協会 イネの病害虫より)

調査日:令和5年8月29日

調査田	捕殺数(株あたり虫数)		
	トビイロウンカ	セジロウンカ	ヒメトビウンカ
岸和田市積川町	0頭	0頭	0頭
和泉市国分町	0頭	0頭	0.013頭 (75株当たり1頭)
泉大津市虫取町	0頭	0頭	0頭

総括

今回の調査においても、定点調査するほ場において、トビイロウンカ、セジロウンカは捕殺されませんでした。また、8月の府内10か所での調査においても、トビイロウンカは確認されておりません。しかしながら、一部地域でのセジロウンカは確認されておりますので、トビイロウンカについても、ほ場内に潜んでいる可能性がありますので、引き続き発生にはご注意ください。



吸汁害:葉先が黄変する。トビイロウンカのような円形の坪枯れにはならない



雌成虫の長翅型:体長 4~4.5,mm



雌成虫の短翅型:体長 4~4.5,mm

出展:ルーラル電子図書館「イネ セジロウンカ」

[http://izumino-ja.ruralnet.or.jp/cgi-](http://izumino-ja.ruralnet.or.jp/cgi-bin/ruraltex)

[bin/ruraltex.php?KID=g331004z&ARG=534b3de382b926534e3de6b0b4e7a8b226424e3de382bbe382b8e383ade382a6e383b3e38](http://izumino-ja.ruralnet.or.jp/cgi-bin/ruraltex.php?KID=g331004z&ARG=534b3de382b926534e3de6b0b4e7a8b226424e3de382bbe382b8e383ade382a6e383b3e38)

2ab